



H1N1 2009-Grippe: Schutzimpfung

EINE SCHUTZIMPfung IST DER BESTE SCHUTZ VOR EINER GRIPPE-ERKRANKUNG UND -VERBREITUNG.

Dieses Jahr sind Impfstoffe zum Schutz gegen die saisonale Grippe und die H1N1 2009-Grippe verfügbar. Der Impfstoff für die saisonale Grippe wird Sie jedoch nicht vor dem H1N1 2009-Influenzavirus schützen.

Bestimmte Personengruppen weisen ein erhöhtes Risiko gegenüber einer H1N1 2009-Grippeinfektion oder grippebedingten Komplikationen auf oder haben engen Kontakt mit Kleinkindern, die für eine Schutzimpfung noch zu jung sind. Diesen Personengruppen wird empfohlen, eine H1N1 2009-Gripeschutzimpfung zu erhalten, sobald diese verfügbar ist.

Personengruppen, denen empfohlen wird, die H1N1 2009-Gripeschutzimpfung als erstes zu erhalten:

- Schwangere
- Personen, die mit Kleinkindern unter 6 Monaten zusammenleben oder diese betreuen
- Medizinisches Personal und Rettungssanitäter
- Alle Personen zwischen 6 Monaten und 24 Jahren
- Alle Personen zwischen 25 und 64 Jahren mit bestimmten chronischen Beschwerden oder einem geschwächten Immunsystem

Wenn die Nachfrage unter den genannten Personengruppen gedeckt worden ist, sollte die Schutzimpfung folgenden Personengruppen ebenfalls angeboten werden:

- Gesunde Erwachsene zwischen 25 und 64 Jahren
- Erwachsene ab 65 Jahren

Hinweis: Bitte teilen Sie der impfenden Person mit, wenn Sie an einer Eierallergie, einer anderen schwerwiegenden Allergie oder an einer bestimmten Krankheit leiden. Dies müssen keine Gründe dafür sein, auf eine Schutzimpfung zu verzichten, das medizinische Personal kann Ihnen jedoch dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen.

ES WERDEN ZWEI H1N1 2009-IMPfstOFFE PRODUZIERT: ein H1N1 2009-Grippeimpfstoff in Form einer Injektion, der normalerweise in den Arm verabreicht wird, und der H1N1 2009-impfstoff in Form von Nasenspray, der in die Nase gesprüht wird. Während alle Personen ab einem Alter von 6 Monaten die Gripeschutzimpfung als Injektion erhalten können, ist die Gripeschutzimpfung als Nasenspray (LAIV) nur für gesunde Personen zwischen 2 und 49 Jahren geeignet, ausgenommen Schwangere. Fragen Sie die impfende Person, ob das Nasenspray für Sie geeignet ist. Bei allen Schutzimpfungsarten sollten Kinder unter 9 Jahren zwei Dosen des Impfstoffes im Abstand von ungefähr einem Monat erhalten. Ältere Kinder und Erwachsene benötigen nur eine Dosis.

GRIPPEschUTZIMPfungen WEISEN EINE SEHR HOHE SICHERHEIT AUF. Der H1N1 2009-Grippeimpfstoff hat voraussichtlich ein ähnliches Sicherheitsprofil wie der saisonale Grippeimpfstoff, der eine sehr hohe Sicherheit aufweist. In den letzten Jahren wurden zig Millionen saisonale Gripeschutzimpfungen durchgeführt und es traten nur sehr selten schwerwiegende Probleme auf.

PERSONEN MIT EINEM ERHÖHTEN RISIKO FÜR GRIPPEBEDINGTE KOMPLIKATIONEN SOLLTEN AUSSERDEM EINE PNEUMOKOKKEN-SCHUTZIMPfung ERHALTEN. Die Pneumokokken-Schutzimpfung (Lungenentzündung) wird für Senioren und Personen ab 2 Jahren empfohlen, die an einer chronischen Erkrankung, einem geschwächten Immunsystem oder an Asthma leiden. Normalerweise ist eine Dosis des Pneumokokken-impfstoffes ausreichend, unter bestimmten Umständen ist jedoch nach 5 Jahren eine zweite Dosis erforderlich.